

疫苗接种活动总结(大全5篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们一起认真地写一份总结吧。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编精心整理的总结范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

疫苗接种活动总结篇一

疫苗接种时有一定的禁忌，有的还会出现副反应，市疾病预防控制中心提醒家长，孩子若有病，接种疫苗一定要及时告知医务人员，疫苗接种后也须注意观察孩子反应，若反应严重就需要治疗。

孩子出生后家长就应该及时办理预防接种证和卡，这样就可以按照接种程序为孩子进行每次接种，每次接种持证进行记录，以防止漏种、重种、误种。家长每次带孩子接种疫苗前，必须仔细阅读所接种疫苗的禁忌症、注意事项及可能出现的副反应等，如实向接种医生说明孩子的身体状况，有无家族史、过敏史及其他慢性疾病，尤其是近一周内有无身体不适等情况，以便接种医生决定孩子是否可以接种相应疫苗。每次接种疫苗完毕后，儿童应该留在接种现场观察30分钟，若无其他反应再离开接种现场。另外回家后尽可能不要让孩子剧烈运动，以便减少可能出现的副反应。疫苗接种后只有部分儿童会出现副反应，因此家长不必紧张，绝大多数副反应都是正常的，症状较轻就不需治疗，一般在24~48小时就会消退，但若反应较重，就需要进行医疗处置，提醒家长注意观察孩子身体变化。(记者/吕华)

疫苗接种活动总结篇二

对于每一位宝宝来说，注射疫苗是有效提高自身免疫力的方式。对于每一位妈妈都知道要给自己的宝宝接种疫苗，但是究竟要接种哪种疫苗，相信很多妈妈都是很混乱的，甚至不是很清楚。那么究竟小孩应该注射哪种疫苗呢？我们快来看看吧。

4、麻疹疫苗：作用是预防麻疹的。宝宝8个月以及6岁的时候都需要接种一次。

什么情况下宝宝不能接种疫苗

很多妈妈们都认识到在宝宝出生以及成长发育的过程中，接种疫苗对于宝宝来说十分的重要，可以有效地提高免疫力。其实不是全部的宝宝都是适合接种疫苗的，那么究竟什么宝宝是不能接种疫苗呢？我们快来看看吧。

3、注意对于患皮肤病的宝宝也是不能进行接种的；

4、对于过敏的宝宝，很容易有不良反应产生，是否要接种疫苗要先咨询医生的意见。

幼儿疫苗的注意事项

1、及时让医生知道宝宝的各项身体状况，比如是否是早产儿，是否营养不良等，这些情况是不适合接种疫苗的，应该咨询医生后再商量对策。

2、患有感冒、腹泻、发热等疾病的宝宝是不可以接种疫苗的，应该在病情痊愈之后再行接种，而肝炎、结核等传染病以及严重心脏病等疾病会导致宝宝免疫力下降，也不可以注射疫苗。

3、患有皮肤病或者过敏体质的宝宝不宜注射疫苗，应该咨询医生的建议。

4、刚刚接种疫苗的宝宝不应该急着回家，而是需要在医院等候20~30分钟左右，一旦宝宝发生不良反应可以及时就医。

5、宝宝出生后，医生会给父母一个小册子，上面会详细写出宝宝需要注射的疫苗和注射时间表，爸妈们一定不要粗心，要严格按照小册子来接种疫苗。

6、宝宝接种疫苗之后，爸妈要注重宝宝的卫生，保证接种部位的清洁，以免引起局部感染。

给宝宝接种疫苗要注意什么

在接种疫苗的时候，如果宝宝有发热或者其他一些特殊情况的，是需要在医生的指导下进行相关疫苗接种的。另外，在给宝宝接种疫苗时还需要注意下面这些事项！

1、先了解自家宝宝的健康状况。宝宝这几天是否接触过有传染病的人，有没有发热、拉肚子、咳嗽等症状，这些问题在给宝宝接种前都需要告诉医生，作为能否进行预防接种的参考，以免造成反效果。

2、查看宝宝有无禁忌症和过敏史。心脏疾患、肝肾疾病、活动性肺结核、皮肤化脓性疾病、急性传染病以及有过敏史、惊厥史等都属不能进行预防接种的范畴。此外，如果宝宝正在接受皮质激素、放射治疗或抗代谢药物治疗也应推迟接种时间。

3、需详细了解要接种的疫苗。接种前，父母不但要事先准备好《预防接种证》以便让医生凭证接种，而且自己也要了解接种的是什么疫苗。如果宝宝在上次接种这种疫苗后出现过一些严重的不良反应，或出现过敏反应，都要告诉医生，看这

次能不能再接种这种疫苗。

4、接种前的护理。在接种前，爸爸妈妈要让宝宝吃好睡好好，以免影响到接种时的状态。另外，还要给宝宝洗澡或洗净手臂，如果天气较冷，要换上柔软宽大的内衣，不仅注射时卷袖子方便，也可避免内衣摩擦针眼处的皮肤。

疫苗接种活动总结篇三

儿童计划疫苗接种(四)

麻疹疫苗

什么年龄适用？

在婴儿8个月大时首次注射，然后在7岁时复种注射一次且比上次的剂量要大。

为什么要接种麻疹疫苗？

如果没有经过免疫，一年之内澳大利亚就会有10~15个孩子死于麻疹，而且麻疹可能会引发严重的肺炎或脑膜炎。

有效吗？

有效程度非常高，在超过95%的临床病例中有效。

有副作用吗？

大约1/10的孩子会出现不适、局部发炎或者发热的症状。麻疹疫苗也被认为是孤独症增发的一个可能的原因。但是，一位就职于威斯敏斯特的一所儿童医院的儿童发展部的专攻孤独症的病理专家顾问，纳塔尔·西莱博士认为：麻疹与孤独症之间没有什么联系。他说：“医生们现在认为这种联系是

巧合的，因为孤独症的症状慢慢会在那些看起来正常的孩子身上表现出来，而这个年龄正是麻疹疫苗接种的时候。”

水痘疫苗

什么年龄适用？

在孩子12个月大时注射一次，如果孩子或成人贻误了，在还没有出现水痘的情况下也都可以注射。

我的孩子需要吗？

水痘是一种由病毒引起的、非常普通的儿童疾病。在一般的健康孩子身上，它表现的并不明显，只能引发一些发痒的起泡的疹或者轻微发热。但是有时候它是非常严重的，每年数以百计的孩子会因此送入医院治疗。免疫力差的孩子患并发症的风险更高。

有效吗？

在防治严重的水痘疾病方面这种疫苗将近100%有效，但是就算经过治疗，10~20%的孩子仍会有轻微的症状。

有副作用吗？

1/5的孩子有出现局部发炎或发热的症状，而3/100的孩子会出现红疹。很少会出现严重的副作用（高烧，肺病如支气管炎、中耳炎等等）。过敏性反应的发生机率也比较小。

疫苗接种活动总结篇四

儿童计划疫苗接种(三)

破伤风疫苗

什么年龄适用？

在2到3个月时一次注射，在4个月，5个月各注射1次，4年和15~强化注射剂量。

我的孩子需要吗？

破伤风，也被称为牙关紧闭症，是由一种毒菌引发的。这种毒菌生长在土壤、灰尘和肥料里，然后通过皮肤上的伤口进入人体。接种该疫苗能保护皮肤上被感染的割伤口和擦伤口。

有效吗？

一次完整的注射接种能在几年内达到接近100%的保护作用。

有副作用吗？

几乎没有。

百日咳疫苗

什么年龄适用？

在3个月时一次注射，在4个月、5个月、4年和15~17年强化注射剂量。

我的孩子需要吗？

百日咳是一种令人非常痛苦的、长期的、能在任何年龄发生的疾病，对婴儿来说特别的危险。在患百日咳的年龄小于6个月的200个婴儿中就会有1个死亡。

有效吗？

在进行标准的婴儿期接种后几年内，该疫苗在80%~90%的场

合是有效的。

有副作用吗？

几乎没有。

白喉疫苗

什么年龄适用？

在2到3个月的时候一剂量，然后在4个月、5个月各注射1针，4年和15~17年的时候强化注射剂量。

我的孩子需要吗？

白喉曾经在澳大利亚非常流行，每年杀死数以千计的人。它是一种影响上呼吸道和偶尔影响皮肤的传染性极强的疾病。白喉病菌的强大毒性能产生一种毒素，这种毒素能破坏心脏和神经组织。即使在最现代化的医疗条件下，1/15的患者仍会死亡。

有效吗？

白喉疫苗几乎100%有效。

有副作用吗？

白喉疫苗，也被称为dtp疫苗，是一种组合的疫苗，包括破伤风和百日咳。在大约1/10的婴儿中dtp疫苗会引发局部的反应（注射点的红色和轻微的发热），严重的不良反应很少见。

疫苗接种活动总结篇五

儿童计划疫苗接种(一)

乙型脑炎疫苗

什么年龄适用？

在孩子12个月大时一次注射，2岁及7岁时各加强种1针。

我的孩子需要吗？

乙脑（流行性乙型脑炎）病毒主要侵犯大脑，又称大脑炎，一般为隐性感染，只有少数人患脑炎，但非常严重。可导致死亡或永久性脑损害。

有效吗？

在94%的临床病例中是有效的。

有副作用吗？

几乎没有。

乙型肝炎疫苗

什么年龄适用？

对新生儿来讲，出生时注射一次，然后在1、6个月或1、2、7个月时注射3剂量，在婴儿时期漏掉接种的孩子也应该被免疫接种。

我的孩子需要吗？

乙型肝炎是一种能使肝脏发炎的病毒。而乙型肝炎疫苗能同时预防急性肝炎和所谓的乙型肝炎病毒的“长期携带”。乙型肝炎的长期携带者体内含有病毒，但却没有什么征兆。这些人将来更容易得肝功能障碍。大概1/4的. 该病毒携带者会在成年时期患上肝癌。

有效吗？

98%的乙型肝炎疫苗都是非常有效的。

有副作用吗？

1/100至1/15的使用者会出现疼痛和发热的症状。