

# 2023年白加黑感冒药说明书(大全5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 白加黑感冒药说明书篇一

阅读以下说明书，完成相关练习：

**【性状】**本品为薄膜衣片。日用片为白色，夜用片为黑色。

**【药物组成】**本品日用片每片含主要成份对乙酰氨基酚325毫克，盐酸伪麻黄碱30毫克，无水氢溴酸右美沙芬15毫克。辅料为l-hpc、k12、吐温-80、pvp、硬脂酸镁、糊精。**【适应症】**本品适用于治疗和减轻感冒引起的发热、头痛、周身四肢酸痛、喷嚏、流涕、鼻塞、咳嗽等症状。

**【用法用量】**口服。一次1-2片，一日3次（早、中各1-2片白片，夜晚1-2片黑片）。12岁以下儿童遵医嘱。

**【不良反应】**有时有轻度头晕、乏力、恶心、上腹不适、口干和食欲缺乏等，可自行恢复。**【禁忌】**对其中任一种成份的药物有过敏史者禁用。

1、每天服用白片与黑片的总量不宜超过8片，每次服用间隔不宜小于6小时。不可超过推荐剂量，若超过剂量，可能出现头晕、嗜睡或精神症状。

2、夜用片用药期间可能引起头晕、嗜睡，故服药期间不宜驾车或高空作业、操纵机器。

3、避免同时服用降压药、抗抑郁药、单胺氧化酶抑制剂及饮

酒。如正在服用其他药品，使用本品前请向医师或药师咨询。

4、肝肾功能不全者慎用。

5、孕妇及哺乳期妇女需慎用。

6. 60岁以上老年患者请遵医嘱。

**【贮藏】** 密封、遮光，在干燥处保存。

**【有效期】** 24个月，请在标明的有效期前使用。

**【生产日期】** 2013年11月20日

## 白加黑感冒药说明书篇二

“白加黑”是什么呀？感冒药？不懂了吧，其实是我们班的两员大将李昊元和魏宇翔。

他们俩表面上最大的不同就是一黑一白，黑的就跟非洲人一样，除了白眼珠子、手指盖子和牙齿，全是黑色，黑得油光光，黑得锃锃亮；白的就跟发面馍馍、剥了皮的鸡蛋、在绣楼里晤了八年似的，白得细嫩嫩，白得粉嘟嘟。他俩在一块，一黑一白，一刚一柔，十分明显，泾渭分明。魏宇翔因为跑得非常快，再加上特别黑，因此得到了一个“非洲野驴”的尊称。李昊元因为说话非常快，加上看了点书，是同学们的活字典，因此得到了一个“白面书生”的雅号。

这就是我们班的“白加黑”。

文档为doc格式

## 白加黑感冒药说明书篇三

【批准文号】 国药准字h10940251

【中文名称】 氨酚伪麻美芬片ii/氨麻苯美片

【生产企业】 拜耳医药保健有限公司启东分公司

【功效主治】 适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咳嗽、咽痛等症状。

【化学成分】 本品为复方制剂，日用片：每片含对乙酰氨基酚325毫克，盐酸伪麻黄碱30毫克，氢溴酸右美沙芬15毫克。辅料为低取代羟丙基纤维素、聚维酮k30、聚乙烯吡咯烷酮k90、糊精、十二烷基硫酸钠、硬脂酸镁、薄膜包衣预混剂。夜用片：每片含对乙酰氨基酚325毫克，盐酸伪麻黄碱30毫克，氢溴酸右美沙芬15毫克，盐酸苯海拉明25毫克。辅料为低取代羟丙基纤维素、聚维酮k30、聚乙烯吡咯烷酮k90、糊精、聚山梨酯80、硬脂酸镁、薄膜包衣预混剂。

白加黑感冒药【药理作用】 本品中对乙酰氨基酚可抑制前列腺素合成而具有解热镇痛作用；盐酸伪麻黄碱具有收缩上呼吸道毛细血管、消除鼻咽黏膜充血、减轻鼻塞、流涕的作用；氢溴酸右美沙芬能抑制咳嗽中枢，具有止咳作用；盐酸苯海拉明为抗组胺药，能进一步减轻鼻塞、流涕、打喷嚏等症状，并有镇静安眠的作用。

白加黑感冒药【药物相互作用】

- 1、本品如与其他解热镇痛药同用，可增加肾毒性的危险。
- 2、本品不宜与氯霉素、巴比妥类、解痉药、酚妥拉明、洋地黄苷类同用。

3、如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

**【不良反应】** 有时有轻度头晕、乏力、恶心、上腹不适、口干、食欲缺乏和皮疹等，可自行恢复。

白加黑感冒药**【禁忌症】** 严重肝肾功能不全者禁用。

**【产品规格】** 白加黑感冒药（日用片）：每片含对乙酰氨基酚325毫克；盐酸伪麻黄碱30毫克，氢溴酸右美沙芬15毫克。

白加黑感冒药（夜用片）：每片含对乙酰氨基酚325毫克；盐酸伪麻黄碱30毫克，氢溴酸右美沙芬15毫克，盐酸苯海拉明25毫克。

或白天每6小时服1次。

夜用片：口服，成人和12岁以上儿童，睡前服1~2片。

**【贮藏方法】** 遮光，密闭，在干燥处保存。

白加黑感冒药**【注意事项】** 1、用药3~7天，症状未缓解，请咨询医师或药师。

2、服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。

3、不能同时服用与本品成份相似的其他抗感冒药。

4、心脏病、高血压、甲状腺疾病、糖尿病、前列腺肥大、青光眼、抑郁症及哮喘等患者以及老年人、12岁以下儿童应在医师指导下使用。

5、夜用片服用后，不得驾驶机、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

- 6、孕妇及哺乳期妇女慎用。
- 7、肝、肾功能不全者慎用。
- 8、运动员慎用。
- 9、如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
- 10、对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- 11、本品性状发生改变时禁止使用。
- 12、请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 13、儿童必须在成人监护下使用。
- 14、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

## 白加黑感冒药说明书篇四

本品日用片每片含主要成份对乙酰氨基酚325mg□盐酸伪麻黄碱30mg□无水氢溴酸右美沙芬15mg□辅料为□l-hpc/k12□吐温-80□pvp□硬脂酸镁、糊精。

本品夜用片每片含主要成份对乙酰氨基酚325mg□盐酸伪麻黄碱30mg□无水氢溴酸右美沙芬15mg□盐酸苯海拉明25mg□辅料为□l-hpc/k12□吐温-80□pvp□硬脂酸镁、糊精。

性状：本品为薄膜衣片。日用片为白色，夜用片为黑色。

作用类别：本品为感冒用药类非处方药药品。

适应症：本品适用于治疗和减轻感冒引起的发热、头痛、周身四肢酸痛、喷嚏、流涕、鼻塞、咳嗽等症状。

## 规格

日用片：每片含对乙酰氨基酚325mg□盐酸伪麻黄碱30mg□无水氢溴酸右美沙芬15mg□

夜用片：每片含对乙酰氨基酚325mg□盐酸伪麻黄碱30mg□无水氢溴酸右美沙芬15mg□盐酸苯海拉明25mg□

用法用量：口服。一次1~2片，一日3次(早、中各1~2白片，夜晚1~2片黑片)。儿童遵医嘱。

不良反应：有时有轻度头晕、乏力、恶心、上腹不适、口干和食欲缺乏等，可自行恢复。

禁忌：对其中任一种成分的药物有过敏史者禁用。

## 注意事项

1. 每天服用白片与黑片的总量不宜超过8片，每次服用间隔不宜小于6小时。不可超过推荐剂量，若超过剂量，可能出现头晕、嗜睡或精神症状。
2. 下列情况者应慎用：咳嗽或其他症状在服药后一周内未改善、加重或复发者；伴随发热、皮疹、红肿或持续头痛者，尤其发热超过三天患者；伴有原发性高血压、心脏病、糖尿病、甲亢、青光眼、前列腺肥大引起排尿困难、肺气肿患者；因吸烟、肺气肿、哮喘引起的慢性咳嗽及痰多粘稠患者。
3. 夜用片用药期间可能引起头晕、嗜睡，故服药期间不宜驾车或高空作业、操纵机器。
4. 饮酒、服镇痛剂、镇静剂会加重嗜睡。
5. 肝肾功能不全者慎用。

6. 服用过量或有严重不良反应时立即去医院就医。

7. 儿童用药请咨询医师或药师。

8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

孕妇及哺乳期妇女用药：妊娠期或哺乳期妇女需慎用。

儿童用药：儿童服用含酒精的饮料易引起过敏。12岁以下儿童患者请遵医嘱。

老年用药：60岁以上老年患者请遵医嘱。

### 药物相互作用

1. 避免同时服用降压药、抗抑郁药、单胺氧化酶抑制剂及饮酒。

2. 如正在服用其他药品，使用本品前请向医师或药师咨询。

药理作用：本品为解热镇痛、镇咳及减轻鼻黏膜充血药。本复方中的对乙酰氨基酚具有解热镇痛作用；盐酸伪麻黄碱具有选择性收缩上呼吸道黏膜毛细血管作用，可减轻鼻咽部黏膜充血、缓解鼻塞症状；氢溴酸右美沙芬具有中枢性镇咳作用，但无成瘾性；盐酸苯海拉明有阻断组胺(h1)受体作用，可对抗组胺引起的微血管扩张和毛细血管通透性增加并具有较强的镇静作用。日用片服用后不会引起嗜睡；夜用片含适量的盐酸苯海拉明，可有助于患者睡眠。

贮藏：密封，遮光，在干燥处保存。

### 包装

(1) 铝塑，每盒1板，每板含日用片10片，夜用片5片。

(2) 铝塑，每盒2板，每板含日用片10片，夜用片5片。

(1) 铝塑，每盒2板，每板含日用片8片，夜用片4片。

有效期：2年，请在小盒标明的有效期前使用。

批准文号：

日用片：国药准字h10940250

夜用片：国药准字h10940251

生产企业：拜耳医药保健有限公司启东分公司

## 白加黑感冒药说明书篇五

阅读以下说明书，完成相关练习：

**【性状】** 本品为薄膜衣片。日用片为白色，夜用片为黑色。

**【药物组成】** 本品日用片每片含主要成份对乙酰氨基酚325毫克，盐酸伪麻黄碱30毫克，无水氢溴酸右美沙芬15毫克。辅料为l-hpc、k12、吐温-80、pvp、硬脂酸镁、糊精。**【适应症】** 本品适用于治疗和减轻感冒引起的发热、头痛、周身四肢酸痛、喷嚏、流涕、鼻塞、咳嗽等症状。

**【用法用量】** 口服。一次1-2片，一日3次（早、中各1-2片白片，夜晚1-2片黑片）。12岁以下儿童遵医嘱。

**【不良反应】** 有时有轻度头晕、乏力、恶心、上腹不适、口干和食欲缺乏等，可自行恢复。**【禁忌】** 对其中任一种成份的药物有过敏史者禁用。

1. 每天服用白片与黑片的总量不宜超过8片，每次服用间隔不



宜小于6小时。不可超过推荐剂量，若超过剂量，可能出现头晕、嗜睡或精神症状。

2. 夜用片用药期间可能引起头晕、嗜睡，故服药期间不宜驾车或高空作业、操纵机器。

3. 避免同时服用降压药、抗抑郁药、单胺氧化酶抑制剂及饮酒。如正在服用其他药品，使用本品前请向医师或药师咨询。

4. 肝肾功能不全者慎用。

5. 孕妇及哺乳期妇女需慎用。

6. 60岁以上老年患者请遵医嘱。

**【贮藏】** 密封、遮光，在干燥处保存。

**【有效期】** 24个月，请在标明的`有效期前使用。

**【生产日期】** 2013年11月20日