结核病日感想 肺结核教学查房心得体 会(精选5篇)

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

结核病日感想篇一

通过骨科护理查房,作为骨科护土业务学习的一种方法,对提高护土的业务素质和护理质量起到一定的促进作用。近一年来,我科收治了各种矫形、骨折等手术患者80多例,对其组织了术前、术后、康复期的护理查房,收到良好的效果。1查房形式和方法:安排每天查房一次,交接新入院患者及手术患者,时间为15-30min[]安排每月查房一次,时间为30-60min[]

- 1.2术后查房:是主要的查房形式,对已完成的手术除按上面的形式外,还要把患者可能在术后出现的护理并发症和预防措施进行认真讨论,责任护士收集资料,制定术后护理计划,做主要发言,对其可能出现的护理问题逐个进行分析总结,并采取相应的措施或预防措施,给予患者心理安慰,给予精神上的鼓励,及早康复。
- 2. 1根据骨科病种采取灵活多样的查房形式,骨科手术病人同时具有内科疾病,护理查房除了学习与骨科手术相关知识外,还请内科医生给我们讲课,针对该病人出现的内科疾病的护理,提出护理要求和护理措施,使参加查房的护士在掌握本专科护理知识的同时,也熟悉了其他专科知识。
- 2.2配合新业务、新技术开展选择病例,为使全科护士整体业 务水平提高,通过护理查房,特别要请技术全面的护士讲解 各种导管及骨牵引、石膏托、外固定架的使用的护理经验,

静脉高营养给药,中心静脉压的测定以及套管针的应用,同时对心电监护仪的使用,保养进行示范讲解和表演,使全科护士通过查房,掌握各种共性的护理新技术。

- 2.3针对护理工作中的不足或失误组织查房,例如1例截瘫患者,因大小便失禁,需要留置导尿,护士在操作时,因操作不当及自身病理变化,反复下尿管,或气囊导管未到位置就注入生理盐水,造成尿道出血后重新处理才解决。针对这个问题组织查房,强调气囊导尿的注意事项,牢记教训,杜绝此类欠缺。
- 3.1密切了医护关系,提高了骨科护士的护理质量,增强了医护人员间的合作。通过查房,掌握了术前、术中、术后的护理要点,使护士的整体水平显著提高,使医护人员配合更默契,满意度更加提高。
- 3.2密切了护患关系,通过术前的心理护理,术中关怀,术后的护理使病人对护士工作非常放心和满意,从而建立了依赖——合作的护患关系,使患者主动配合手术,术后病人满意率达99%。

结核病日感想篇二

结核病是一种非常严重的传染病,其传播速度和危害程度都十分高,给人们的生活和健康带来了很大的威胁。为了摆脱这个困扰,我们制定了一系列的防治措施并且进行了积极的宣传和教育。我在参与这些活动的过程中,深切体会到,预防结核病需要从日常生活的每一个细节入手,并形成一种长期的习惯。下面我将分享我在防结核活动中的体会,以期能够给读者以启示。

首先,增强健康意识是预防结核病的基础。结核的传播主要是通过空气中的飞沫传播的,因此我们需要充分认识到个人卫生对于预防疾病的重要性。每个人都应该做好日常的清洁

工作,勤洗手、保持卫生,减少病菌的传播。此外,我们还要定期参加各种健康检查,尤其是进行胸部的检查,以及时发现潜在的结核感染。

其次,良好的饮食习惯对于预防和治疗结核病至关重要。健康的饮食不仅能够增强身体的抵抗力,还可以提高治疗效果。我们应该遵循均衡饮食的原则,摄入适量的营养物质,多吃蔬菜、水果和富含蛋白质的食物,同时避免过多糖分和油脂的摄入。此外,定时进食、养成细嚼慢咽的习惯也是很有帮助的。

再次,良好的生活习惯对于预防结核病同样至关重要。人们应该重视充足的睡眠,保持足够的休息来恢复体力和提高免疫力。此外,合理安排工作和生活,避免过度劳累和精神压力过大,对预防结核病也有一定的帮助。另外,合理的作息时间和规律的锻炼也可以加强人体免疫系统,减少病菌侵袭的机会。

此外,积极参与宣传和教育活动对于预防结核病起着重要的推动作用。政府和卫生部门会组织一些宣传和教育活动,我们要积极参与并向身边的人们传播防结核的知识。只有通过大家共同努力,才能有效地提高整个社会的防范意识。此外,我们还可以利用信息化手段,比如网络、手机等进行宣传,提高信息传播的效率和覆盖面。

最后,个人自我保护和家庭的防护也是不可忽视的。我们应该尽量避免与患有结核病的人近距离接触,避免共用餐具、毛巾等容易传播病菌的物品。此外,要保持良好的通风环境,保持空气流通,减少病菌在室内滋生的可能性。同时,家庭成员应互相提醒和监督,遵循共同的防护措施,共同做好防结核的工作。

总之,预防结核病需要从个人、家庭、社会多个层面共同努力。只有通过全面系统的防护措施,才能够有效地控制结核

病的传播,保护人们的健康和生命安全。希望通过我个人参与防结核活动的体会,能够引起更多人的重视和关注,并共同努力,为打赢这场抗击结核病的战争贡献自己的一份力量。

结核病日感想篇三

今年 3月24日是第_个"世界防治结核病日",今年的主题是"你我共同参与,依法防控结核—发现、治疗并治愈每一位患者"。

为了让结核病防治知识家喻户晓,提高人民群众知晓率,动员全社会参与和依法防控结核病工作,在第_个"3.24世界防治结核病日"来临之际。按照卫计局健教科要求和统一部署,为加强结核病防控工作,促进防控工作的落实,营造全社会共同防控结核病的氛围,___年3月23日我元紧紧围绕宣传主题,在我院辖区西泉主要街道和中小学门口开展一次盛大的宣传活动,使结核病防控知识进入了千家万户,极大地提高了人民群众结防知识普及率。

现将本次活动总结如下:

在我辖区西泉村街道,开展了大型结核病防控宣传、咨询、 义诊服务宣传活动,工作人员精心准备发放了结核病防治知 识小画册五十多份,接受结核病知识咨询五十人次,我院医 生接受慢性病人义诊30余人次,宣传单100多张,横幅1个, 相关知识宣传品100多份,宣传车一辆,届时我院疾控科人员 为村结核病人进行健康访视,当日下午疾控科在建福中学个 别班举办结核病防治知识讲座。

结核病日感想篇四

段落一: 引言

结核病是一种严重的全球性传染病,长期以来给人类的健康

和社会带来了严重的威胁。为了有效预防和控制结核病,许多国家和地区开展了大规模的结核防治工作。在参与结核防治工作中,我逐渐积累了一些心得和体会,希望与大家分享。

段落二:加强宣传,提升公众意识

在结核防治工作中,加强宣传是至关重要的。通过宣传,我们可以提高公众对结核病的认识和了解,传递正确的防治知识,提高公众自我保护意识。针对不同群体,我们可以选择不同的宣传形式,例如举办健康讲座、发放宣传册、制作宣传视频等。同时,我们也要利用社交媒体等信息渠道,将结核防治的知识传播给更多的人群,以引起公众的关注和参与。

段落三: 加大病例筛查力度, 确保早期发现和治疗

早期发现和治疗是结核防治工作的关键环节。单位和社区应加大对高危人群的筛查力度,及时发现结核病感染者,并针对性地进行检测和治疗。在筛查工作中,可以采用结核菌素试验和胸部X光片等方式,对呼吸道症状患者、结核病疫点接触者等进行筛查。对于检测呈阳性的人群,要积极组织治疗,并进行随访,以确保治愈。此外,应建立健全的流行病学监测和报告制度,及时掌握结核病的发展趋势,采取相应的防控措施,避免结核病的扩散。

段落四:加强医疗机构的结核控制措施

医疗机构是结核疫情防治的重要场所,也是感染结核病的高危场所。为了保障医务人员和患者的生命安全,医疗机构应加强结核控制措施的落实。首先,要建立健全的感染控制管理制度,加强空气消毒、个人防护等措施的宣传和培训,提高医务人员的结核病防护意识。其次,要加强对结核病患者的管理,建立病房隔离制度,防止交叉感染的发生。最后,医疗机构还应积极参与结核病预防和控制工作,合理利用各种资源和手段,提高结核病的诊疗水平和治愈率。

段落五:加强国际合作,共同应对结核病挑战

结核病是全球性的健康问题,需要各国共同努力,加强国际合作,共同应对挑战。首先,各国应加强信息交流和经验分享,通过了解不同国家和地区的防控经验,寻求更加有效的防治措施。其次,要加强技术援助和人员培训,提高结核防治水平和能力。最后,各国政府和国际组织应加大投入,增加对结核防治工作的支持,共同推动全球结核病的消除。

结论:

结核防治工作是一项庞大而复杂的任务,需要各个方面共同努力。通过加强宣传,提升公众意识;加大病例筛查力度,确保早期发现和治疗;加强医疗机构的结核控制措施;加强国际合作,共同应对结核病挑战,我们就可以更好地预防和控制结核病,保障人民的身体健康。同时也希望未来能有更多的科学家和医务人员投身到结核防治事业中,共同为全球结核病的消除贡献自己的力量。

结核病日感想篇五

结核病是由结核杆菌感染引起的慢性传染病,治疗周期长。 正是因为它具有传染性,导致了人们对结核病避之不及,也 正是因为人们对于结核病的传染性的认识不到位,导致了结 核病患者受到了他人的排斥和歧视,造成了他们自卑焦虑的 心理;6个月以上的治疗周期,患者容易丧失治疗信心,由于 种种原因而自行停药。这些都加剧了结核病防治工作以及督 导管理工作的困难。

作为一名社区结核病访视医生,首先在了解病人病情的情况下,向病人说明对方所服用的药物名称、分别服用时间及服用剂量,其次说明用药按时规律全程的重要性及科学性,向患者及家属讲解关键月末痰送痰检查的必要性。让病人从心理上接受了解自己患病情况,提高病人的依从性同时树立起

患者治愈结核病的信心。其次即为健康宣教,向患者及患者 家属(家督员)说明该病的传染源,易感因素,易感者及临床 症状。让病家家属注意消毒隔离,若有疑似症状必须及时就 诊排查。许多结核病患者服用药物以后会出现不同程度的不 良反应,那是一个非常痛苦的过程,访视员一定要认真处理 好这种矛盾能让提高病人用药依从性。

对待患者一定要有百分百的耐心,我曾经在随访中就遇到了这样的情况,一位离休干部服用药物一段时间了,不良反应比较明显,打电话预约访视时就能感觉到他妻子的情绪很不好,到了以后病人不原意出来见我,我照例先到卫生间看了他的晨尿颜色,他的妻子给我看了每天用药督导卡片,说他闹情绪,两天没有用药,我站在病人房门外给他解释药物的不良反应现象是正常的,请他一定要坚持服用下去等等。一个小时后患者情绪稳定了,终于开门出来了,第一句话就是:"我现在要吃药,小年轻不要小看我老头子"。听到这话我就放心了,我详细嘱咐他服药注意事项,消除了患者顾虑,患者表示接受。临走时,老阿姨站在门口一直目送我下楼,那一刻我深深感受到了自己职责的重要性。

对待患者一定要有百分百的耐心和爱心,23岁外地来打工的小姑娘,用药3月后发现自己皮肤变黑了,自行停药三天,我打电话过去,她冲我发脾气,说疼痛可以忍受,但是不能毁容,说着说着痛哭起来,我给他解释这是药物的副反应,病治好了,停药后就会好的。之后和她聊家庭,聊工作,畅想未来,小姑娘终于意识到停药的危害了,之后一直坚持用药,现在结婚了,收到她喜糖的时候,工作的成就感让我开心了一天。

在无数次的督导工作中,我慢慢地成长起来,深刻体会到:提高患者的治疗依从性是治愈结核病的关键,良好的沟通技巧有助于提高结核病督导管理员的工作质量,能把结核病患者的困难当作自己的事情来解决,更是督导工作取得成功的秘诀。回想走过的历程,沥沥在目,令人难忘。工作的辛苦,

收获的甘露,就像一杯陈年老酒,直浇心田,回味无穷!

【篇二】关于结核病的心得体会

结核病是由结核杆菌感染引起的慢性的传染病,治疗周期长。 正是因为它具有传染性,导致了人们对结核病避之不及,也 正是因为人们对于结核病的传染性的认识不到位,导致了结 核病患者受到了他人的排斥和歧视,造成了他们自卑焦虑的 心理;6个月以上的治疗周期,患者容易丧失治疗信心,由于 种种原因而自行停药。这些都加剧了结核病防治工作以及督 导管理工作的困难。

作为一名社区结核病访视医生,首先在了解病人病情的情况下,向病人说明对方所服用的药物名称、分别服用时间及服用剂量,其次说明用药按时规律全程的重要性及科学性,向患者及家属讲解关键月末痰送痰检查的必要性。让病人从心理上接受了解自己患病情况,提高病人的依从性同时树立起患者治愈结核病的信心。其次即为健康宣教,向患者及患者家属(家督员)说明该病的传染源,易感因素,易感者及临床症状。让病家家属注意消毒隔离,若有疑似症状必须及时就诊排查。许多结核病患者服用药物以后会出现不同程度的不良反应,那是一个非常痛苦的过程,访视员一定要认真处理好这种矛盾能让提高病人用药依从性。

对待患者一定要有百分百的耐心,我曾经在随访中就遇到了这样的情况,一位离休干部服用药物一段时间了,不良反应比较明显,打电话预约访视时就能感觉到他妻子的情绪很不好,到了以后病人不原意出来见我,我照例先到卫生间看了他的晨尿颜色,他的妻子给我看了每天用药督导卡片,说他闹情绪,两天没有用药,我站在病人房门外给他解释药物的不良反应现象是正常的,请他一定要坚持服用下去等等。一个小时后患者情绪稳定了,终于开门出来了,第一句话就是:我现在要吃药,小年轻不要小看我老头子。听到这话我就放心了,我详细嘱咐他服药注意事项,消除了患者顾虑,患者

表示接受。临走时,老阿姨站在门口一直目送我下楼,那一刻我深深感受到了自己职责的重要性。

对待患者一定要有百分百的耐心和爱心,23岁外地来打工的小姑娘,用药3月后发现自己皮肤变黑了,自行停药三天,我打电话过去,她冲我发脾气,说疼痛可以忍受,但是不能毁容,说着说着痛哭起来,我给他解释这是药物的副反应,病治好了,停药后就会好的。之后和她聊家庭,聊工作,畅想未来,小姑娘终于意识到停药的危害了,之后一直坚持用药,现在结婚了,收到她喜糖的时候,工作的成就感让我开心了一天。

在无数次的督导工作中,我慢慢地成长起来,深刻体会到:提高患者的治疗依从性是治愈结核病的关键,良好的沟通技巧有助于提高结核病督导管理员的工作质量,能把结核病患者的困难当作自己的事情来解决,更是督导工作取得成功的秘诀。回想走过的历程,沥沥在目,令人难忘。工作的辛苦,收获的甘露,就像一杯陈年老酒,直浇心田,回味无穷!

【篇三】关于结核病的心得体会

近年来,我国各地在校学生结核病的疫情有明显回升趋势,学校结核病的暴发时有发生,严重影响了学校的正常教学秩序,也给学生的身心健康和正常发育造成了极大的伤害。如2003年某省中学同时发生结核病的学生多达100名;2003年某省中学一女生宿舍,8人中发生肺结核病人5例,其中4例是在1个月内相继发病;2006年某省中学同时发生结核病64例;某市2006年高考后有30名学生因患肺结核病而失去了被录取的机会。得了肺结核病如果不能得到及时治疗和彻底治疗,不仅病人会丧失劳动能力或失去在校学习的机会,而且还有可能传染他人。

青少年学生是一个特殊的群体,人员密度大、相互接触密切、学习压力大、营养条件差、缺乏体育锻炼,也容易感染和传

播结核病。他们正处于身心发育阶段,由于紧张的学习和集体生活的特点,学校结核病暴发的案例时有发生,给青少年学生的身心健康带来了严重的危害。

本知识的宣传,向家庭和社区辐射,从而提高当地结核病防治知识的知晓率,促进不良行为的改变,对预防结核病的发生可产生较大的影响。因此在学校开展结核病健康促进活动不但可以有效地预防青少年学生发生结核病,同时也可对全社会的结核病预防控制工作发挥重要作用。

- (1) 积极发现并治愈在校学生中的肺结核病人。如果发现连续咳嗽、咳痰三个星期以上或者有咯血等症状的学生,就应怀疑可能得了肺结核,要及时报告校医和学校领导,并尽快与家长取得联系,及时带同学到结核病防治专业机构检查。
- (2)一旦确诊学生或教职工得了肺结核,一定要休学或者休假在家接受正规治疗,避免传染其他同学。等到经过检查确认没有传染性了,凭结核病防治机构的证明就可以复学、上岗。
- (3) 积极开展爱国卫生运动,努力改善学生的学习和生活环境,对教室和集体宿舍要经常通风换气,保持室内空气新鲜。
- (4) 要养成良好的卫生习惯,在咳嗽、打喷嚏的时候应该将手纸巾捂住嘴巴和鼻子,避免结核病菌通过飞沫传染其他人。
- (5)加强体育锻炼,生活要有规律,注意饮食营养和睡眠充足,保

持健康心理,增强机体抵抗力,尽量减少发病机会。预防结核,不能忽视网吧。肺结核与网吧是两个不相关联的名词,但在临床实践中,越来越多的病例让他们联系在一起。网吧作为一种新兴的娱乐场所,正成为某些疾病,特别是呼吸道传染病的孳生之地。

第一、网吧作为室内公共场所,人多且杂,不乏带菌者;

三、经常上网者缺乏体育锻炼,很多人营养不良,身体抵抗力低下,极易感染发病。

由此可见,在传染源、传播途经及易感人群都占全的条件下,极易发病。

结核病, 你了解多少

什么是结核病?结核病是由结核杆菌侵入人体引起的一种慢性传染病,可能发生在人体的任何部位,其中以肺部最为多见。

什么是传染性结核病人?传染性结核病人一般指痰涂片检查发现结核杆菌的肺结核病人,具有传染性。

结核病是怎样传染的?肺结核是一种慢性传染病,它的传染途径主要是呼吸道传染,当传染性肺结核病人咳嗽、打喷嚏、大声说话时喷出带有结核菌的飞沫,健康人吸入肺部造成感染,而得结核病。据统计,一个传染性肺结核病人一年中平均可传染10—15人。与肺结核病人一起吃饭要紧吗?一般说来,结核病不会通过吃饭经口传染,但吃饭时对方咳嗽、打喷嚏、大声说话,也可以发生飞沫感染。

结核病人常见症状是哪些?咳嗽、咳痰、咯血、胸痛、消瘦、 食欲不振、盗汗、月经不调等,尤其连续咳嗽、咳痰两周以 上,就应怀疑是否得了肺结核。

怎样发现和诊断结核病?如果连续咳嗽、咳痰两周以上或咯血,应及时主动到结核病防治所(院)就诊,在医生的指导下留痰标本,做痰结核菌检查[x线胸透或拍片,15岁以下儿童,应做结核菌素试验,辅助检查。

怎样才能治好结核病?得了结核病,应到结核病防治所进行正规治疗,在医务人员或经过培训的家人、志愿者等督导人员的督导下,吞服每剂药品,避免漏服和减量,严格按医嘱服药,以保证治疗效果。疗程一般为6—8个月。