最新清热镇咳糖浆说明书及用量(精选8篇)

竞聘通常需要参加面试和笔试等选拔环节。竞聘材料的撰写需要注意突出自己在相关领域的成就和经验。以下是小编为大家整理的竞聘求职信范文，供大家参考写作时可以借鉴。

清热镇咳糖浆说明书及用量篇一

【商品名称】苏菲咳糖浆(太极)

【拼音全码】sufeiketangjiang

【主要成份】百部流浸膏、甘草流浸膏、薄荷脑、桑白皮流浸膏、氯化铵、桔梗流浸膏、盐酸麻黄碱。

【性状】苏菲咳糖浆为棕色的浓厚液体;气芳香，味甜。

【适应症/功能主治】祛痰镇咳。用于咳嗽，气喘，多痰。

【规格型号】100ml

【用法用量】口服，一次10毫升，一日3次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】1.严重肝肾功能不全、溃疡病患者禁用。2.高血压、动脉硬化、心绞痛、甲状腺功能亢进等患者禁用。3.孕妇和哺乳期妇女禁用。

【注意事项】1.忌食辛辣、油腻食物。2.支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。3.苏菲咳糖浆含氯化铵、盐酸麻黄碱。运动员慎用;肝肾功能异常者及老

年患者慎用;青光眼、前列腺肥大患者应在医师指导下使用;服用后如有头晕、头痛、心动过速、多汗等症状应咨询医师或药师。4.心脏病、糖尿病患者慎用。5.儿童、体质虚弱及胃肠功能差者慎用。6.服药期间，若患者出现高热，体温超过38度，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。7.服用3天病证无改善，应停止服用，去医院就诊。8.对苏菲咳糖浆过敏者禁用，过敏体质者慎用。9.苏菲咳糖浆性状发生改变时禁止使用。10.儿童必须在成人监护下使用。11.请将苏菲咳糖浆放在儿童不能接触的地方。12.如正在使用其他药品，使用苏菲咳糖浆前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】1.苏菲咳糖浆不应与优降宁等单胺氧化酶抑制剂合用。2.苏菲咳糖浆不应与磺胺嘧啶、呋喃妥因同用3.苏菲咳糖浆不应与洋地黄类药物同用。4.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】100ml/瓶。

【有效期】24月

【执行标准】ws-11428(zd1428)

【批准文号】国药准字z51022362

【生产企业】太极集团四川南充制药厂

苏菲咳糖浆(太极)的功效与作用苏菲咳糖浆(太极)祛痰镇咳。用于咳嗽，气喘，多痰。

清热镇咳糖浆说明书及用量篇二

【商品名称】柴胡镇咳片(知客)

【拼音全码】chaihuzhenkepian(zhike)

【主要成份】柴胡。

【性状】柴胡镇咳片(知客)为糖衣片，除去糖衣后显棕褐色;气微，味微咸、苦、涩。

【适应症/功能主治】镇咳。用于感冒引起的咳嗽，支气管炎。

【规格型号】0.1g*24s

【用法用量】口服，一3～5片，一日3次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】尚不明确。

【注意事项】尚不明确。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用,详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封。

【包装】0.1g*24s/盒。

【有效期】24月

【批准文号】国药准字z4629

【生产企业】湖北汇中制药有限公司

柴胡镇咳片(知客)的功效与作用柴胡镇咳片(知客)镇咳。用于感冒引起的咳嗽，支气管炎。

清热镇咳糖浆说明书及用量篇三

答：1.忌食辛辣、油腻食物。2.支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。3.苏菲咳糖浆含氯化铵、盐酸麻黄碱。运动员慎用;肝肾功能异常者及老年患者慎用;青光眼、前列腺肥大患者应在医师指导下使用;服用后如有头晕、头痛、心动过速、多汗等症状应咨询医师或药师。4.心脏病、糖尿病患者慎用。5.儿童、体质虚弱及胃肠功能差者慎用。6.服药期间，若患者出现高热，体温超过38度，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。7.服用3天病证无改善，应停止服用，去医院就诊。8.对苏菲咳糖浆过敏者禁用，过敏体质者慎用。9.苏菲咳糖浆性状发生改变时禁止使用。10.儿童必须在成人监护下使用。11.请将苏菲咳糖浆放在儿童不能接触的地方。12.如正在使用其他药品，使用苏菲咳糖浆前请咨询医师或药师。

清热镇咳糖浆说明书及用量篇四

【商品名称】百咳静糖浆(太极)

【拼音全码】baikejingtangjiang

【主要成份】陈皮、麦冬、前胡、苦杏仁(炒)、清半夏、黄芩、百部(蜜炙)、黄柏、桑白皮、甘草、麻黄(蜜炙)、葶苈子(炒)、紫苏子(炒)、天南星(炒)、瓜蒌仁(炒)、桔梗、瓜蒌仁(炒)。辅料为蔗糖、苯甲酸钠、香精。

【性状】百咳静糖浆为黑褐色的液体;气香，味微苦涩。

【适应症/功能主治】清热化痰，止咳平喘。用于外感风热所致的咳嗽、咯痰;感冒，急、慢性支气管炎见上述证候者。

【规格型号】100ml

【用法用量】口服。1岁至2岁一次5毫升;3岁至5岁一次10毫升;成人一次20～25毫升，一日3次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】孕妇禁用;糖尿病患者禁服。

【注意事项】1.忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻、香燥、过咸食物。2.不宜在服药期间同时服用滋补性中药。3.高血压、心脏病患者慎服。有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。4.严格按用法用量服用，儿童、年老体弱者应在医师指导下服用。5.服药3天症状无缓解，应去医院就诊。6.对百咳静糖浆过敏者禁用，过敏体质者慎用。7.药品性状发生改变时禁止服用。8.儿童必须在成人监护下使用。9.请将此药品放在儿童不能接触的地方。10.如正在服用其他药品，使用百咳静糖浆前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封，置阴凉处。

【包装】口服液体药用聚酯瓶，每瓶100毫升。

【有效期】36月

【执行标准】中国药典版一部

【批准文号】国药准字z51021623

【生产企业】太极集团四川天诚制药有限公司

百咳静糖浆(太极)的功效与作用百咳静糖浆(太极)清热化痰，止咳平喘。用于外感风热所致的咳嗽、咯痰;感冒，急、慢性

支气管炎见上述证候者。

清热镇咳糖浆说明书及用量篇五

柴胡镇咳片是不建议孕妇服用的，如需服用，应先咨询医生或药师。怀孕后，孕妇的身体状况有所改变，体内的酶对某些药物的代谢过程也有一定的影响。并且，胎儿正在生长发育阶段，孕期随意用药容易导致药物被胎儿吸收，尤其是在孕早期胎器官形成时，药物对胎儿的影响较大。

柴胡镇咳片在临床上适用于治疗感冒引起的咳嗽，支气管炎。柴胡镇咳片为糖衣片，出去糖衣片显棕褐色;气微，味微咸、苦、涩。主要成份是柴胡干浸膏，柴胡味辛、苦，性微寒。和解表里，疏肝解郁，升阳举陷，退热截疟。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛。

柴胡镇咳片的有效成分柴胡离子r肽，对侵入上呼吸道的病菌具有超强吞噬作用，能及时抑制病菌的扩散与复制;有效成分柴胡离子g肽，能够持续增强上呼吸道毛细血管通透性，加速血液的循环，快速消炎清肺;有效成分柴胡离子b肽，对上呼吸道病菌等垃圾毒素具有极强的吸附清排作用，能及时通过痰液和血液将有毒物质排出。柴胡镇咳片在抗菌，消炎，清毒的同时，有效物质镇咳离子平衡咳嗽反射，修复呼吸充血水肿，抑制呼吸道过敏反应，增强呼吸道的抗菌能力，快速镇咳。

综上所述，孕妇如需服用柴胡镇咳片，应在医生或药师的指导下服用。柴胡镇咳片在临床上的疗效可靠，且安全性高，值得患者信赖。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

清热镇咳糖浆说明书及用量篇六

答：

1.忌辛辣、油腻食物。

2.支气管炎扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

3.服用三天病证无改善，应停止服用，去医院就诊。

4.服药期间，若患者出现高热，体温超过38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

5.儿童、孕妇、体质虚弱、糖尿病患者及脾胃虚寒者慎用。

6.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

7.药品性状发生改变时禁止使用。

8.儿童必须在成人监护下使用。

9.请将此药品放在儿童不能接触的地方。

10.如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

清热镇咳糖浆说明书及用量篇七

【商品名称】镇咳宁糖浆(普元)

【拼音全码】zhenkeningtangjiang(puyuan)

【主要成份】甘草流浸膏、桔梗酊、盐酸麻黄碱、桑白皮酊。

【性状】镇咳宁糖浆(普元)为深褐色的粘稠液体;气芳香、味甜。

【适应症/功能主治】镇咳祛痰。用于伤风咳嗽、支气管炎、哮喘等。

【规格型号】100ml

【用法用量】口服，一次5-10ml，一日3次。

【不良反应】尚不明确。

【禁忌】尚不明确。

【注意事项】在医生指导下用药;冠心病、心绞痛和甲状腺机能亢进患者慎用。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封，置阴凉处。

【包装】100ml/瓶/盒。

【有效期】24月

【批准文号】国药准字z51021432

【生产企业】四川省通园制药有限公司

镇咳宁糖浆(普元)的功效与作用镇咳宁糖浆(普元)镇咳祛痰。用于伤风咳嗽、支气管炎、哮喘等。

清热镇咳糖浆说明书及用量篇八

咳舒糖浆能治疗风热咳嗽。咳舒糖浆含枇杷叶、南沙参、桔梗、浙贝母、氯化铵、薄荷脑。辅料为蔗糖、焦糖、苯甲酸钠。其中南沙参养阴清肺，化痰，益气。用于肺热燥咳，阴虚劳嗽，干咳痰黏，气阴不足，烦热口干。桔梗宣肺，长于化痰止咳，其祛痰作用主要是由所含的桔梗皂甙所引起。诸药合用，起到了相辅相成的作用，对风寒、风热类型的咳嗽均有较好的疗效。咳舒糖浆的注意事项是：

1.忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

2.不宜在服药期间同时服用滋补性中药。

3.有支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者出现咳嗽时应去医院就诊。

4.咳舒糖浆含氯化铵。肝肾功能异常者及老年患者慎用;哺乳期妇女及消化性溃疡患者应在医师指导下使用。

5.糖尿病患者及有其他慢性病严重者应在医师指导下服用。

6.儿童应在医师指导下服用。

7.服药3天症状无缓解，应去医院就诊。

8.对咳舒糖浆过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9.咳舒糖浆性状发生改变时禁止使用。

10.儿童必须在成人监护下使用。

11.请将咳舒糖浆放在儿童不能接触的地方。

12.如正在使用其他药品，使用咳舒糖浆前请咨询医师或药师。

中医认为，外感风、寒、燥、热，湿邪犯肺，影响肺的宣发功能，临床表现为咳嗽，而咳嗽分风寒及风热两类。风热咳嗽初起咳嗽频作，喉痒声重，痰白稀薄，伴鼻塞流涕，恶寒无汗，发热头痛，舌苔薄白等;风热咳嗽,咳嗽痰多，稠黏难咯，口渴，面红唇赤，烦躁，纳呆，大便秘结，小便色黄，舌红苔黄厚等。治宜宣肺降气，祛除外邪。